AMUKINE® MED

0,05% soluzione cutanea

MEDICINALE DI AUTOMEDICAZIONE

Sodio Ipoclorito

# AMUKINE MED

0,05% soluzione cutanea Sodio Ipoclorito

PRIMA DELL'USO
LEGGERE CON ATTENZIONE TUTTE LE INFORMAZIONI CONTENUTE IN ETICHETTA

**Questo è un medicinale di AUTOMEDICAZIONE che può essere usato per curare disturbi lievi e transitori facilmente riconoscibili e risolvibili senza ricorrere all'aiuto del medico. Può essere quindi acquistato senza ricetta, ma va usato correttamente per assicurarne l'efficacia e ridurne gli effetti indesiderati.**

- **Per maggiori informazioni e consigli rivolgersi al farmacista.**
- **Consultare il medico se il disturbo non si risolve dopo un breve periodo di trattamento.**

CHE COSE AMUKINE MED 0,05% Soluzione cutanea è un disinfettante per uso topico dermatologico.

PERCHÉ SI USA AMUKINE MED 0,05% soluzione cutanea si usa nei seguenti casi:
- disinfezione e pulizia della cute lesa (ferite, piaghe, ustioni, ecc.); - disinfezione dei genitali esterni.

QUANDO NON DEVE ESSERE USATO Ipersensibilità al sodio ipoclorito o ad uno qualsiasi degli eccipienti.

PRECAUZIONI PER L'USO Il prodotto è solo per uso esterno. L'uso, specie se prolungato, dei prodotti per uso topico può dare origine a fenomeni di sensibilizzazione. In tal caso interrompere il trattamento e consultare il medico per istituire un'idonea terapia. La presenza di materiali organici (proteine, siero, sangue, ecc.) riduce l'attività dell'antisettico. L'applicazione topica del prodotto può dissolvere grumi di sangue e causare sanguinamento.

QUALI MEDICINALI O ALIMENTI POSSONO MODIFICARE L'EFFETTO DEL MEDICINALE Evitare l'uso contemporaneo di altri antisettici e detergenti. Informare il medico o il farmacista se si è recentemente assunto qualsiasi medicinale, anche quelli senza prescrizione medica.

È IMPORTANTE SAPERE CHE L'ingestione o l'inalazione accidentale può avere conseguenze gravi, talora fatali. Evitare il contatto con gli occhi. Dopo breve periodo di trattamento senza risultati apprezzabili, consultare il medico. Durata, durante la gravidanza e l'allattamento: Chiedere consiglio al medico o al farmacista prima di prendere qualsiasi medicinale. AMUKINE MED 0,05% soluzione cutanea può essere usato durante la gravidanza e l'allattamento.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari: Non pertinente

COME USARE QUESTO MEDICINALE Dosi: Ripetere le applicazioni secondo necessità. Non superare le 6 applicazioni quotidiane. Attenzione: non superare la dosi indicate. Durata: per quanto tempo: Usare solo per brevi periodi di trattamento. Come AMUKINE MED 0,05% soluzione cutanea è pronto all'uso. Applicare localmente mediante: - lavaggio, bagno, irrigazione, - compresse imbevute, - bendaggi inumiditi.

COSA FARE SE AVETE PRESO UNA DOSE ECCESSIVA DI MEDICINALE In caso di ingestione accidentale avvertire immediatamente il medico o rivolgersi al più vicino ospedale.

SE SI HA QUALSIASI DUBBIO SULL'USO DI AMUKINE MED, RIVOLGERSI AL MEDICO O AL FARMACISTA

EFFETTI INDESIDERATI Come tutti i medicinali, Amukine Med può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino. Le soluzioni di ipoclorito possono essere irritanti per la cute. è possibile il verificarsi, in qualche caso, di intolleranza (bruciore o irritazione). Sono stati segnalati casi di dermatite allergica da contatto. Il rispetto delle istruzioni contenute nel foglio illustrativo riduce il rischio di effetti indesiderati. Se uno qualsiasi degli effetti indesiderati si aggrava, o se si nota la comparsa di un qualsiasi effetto indesiderato non elencato in questo foglio illustrativo, informare il medico o il farmacista.

SCADENZA E CONSERVAZIONE Scadenza: vedere la data di scadenza riportata sulla confezione.La data di scadenza indicata si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato. Attenzione: non utilizzare il medicinale dopo la data di scadenza indicata sulla confezione. Conservare a temperatura inferiore a 30°C. Conservare il flacone in ambiente fresco e asciutto al riparo dalla luce solare diretta. Richiudere il flacone dopo ogni uso. I medicinali non devono essere gettati nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chiedere al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente. TENERE IL MEDICINALE FUORI DALLA PORTATA E DALLA VISTA DEI BAMBINI. È importante avere sempre a disposizione le informazioni sul medicinale, pertanto conservare sia la scatola che il foglio illustrativo.

COMPOSIZIONE 100 ml contengono: principio attivo: sodio ipoclorito 0,057 g (cloro attivo 0,055 g); eccipienti: sodio cloruro, sodio idrato, sodio tetraborato decaidrato, acqua depurata.

COME SI PRESENTA AMUKINE MED 0,05% soluzione cutanea si presenta in forma di soluzione per uso esterno. Il contenuto della confezione è di 250 ml, 500 ml o 1000 ml.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO AMUCHINA S.r.l.
Via Pontasso, 13 - 16015 Casella (Genova).

CONCESSIONARIO PER LA VENDITA: Azienda Chimiche Riunite Angelini Francesco - A.C.R.A.F. S.p.A.
Viale Amelia, 70 - 00181 Roma

PRODUTTORE A.C.R.A.F. S.p.A. Via Pontasso, 13 – 16015 Casella (Genova).

REVISIONE DEL FOGLIO ILLUSTRATIVO DA PARTE DELL'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO:
Dicembre 2012

Lotto n.: Scad.

REGISTRAZIONE E AUTORIZZAZIONE
AIC n. 032192027
Cod. 419330 01023456

AMUCHINA
Amuchina S.r.l. Genova

Flacone da 500 ml e

Lotto 2

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIECUT NAME 210 X 105 mm | | | Colour 1 K | Colour 2 485 | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ANGELINI | **OBJECT** **LABEL** **Amukine Med 0,05%** | | **ARTWORK N.** **PSN022174** **date 26/11/13** |
| OLD ARTWORK N. PSM019556 | VERSION N.0 | THIS DESIGN IS 'PROPERTY' OF A.C.R. ANGELINI FRANCESCO S.P.A. AND MUST NOT BE DELIVERED OR EXHIBITION TO ANOTHER PERSON IN ORIGINAL OR IN COPY. | |
| SCALE 1:1 | DISIGNED BY M.BRACONI | APPROVED | *Packaging Department* |
| BRAILLE TEXT | AMUKINE MED 0,05 % SOLUZIONE CUTANEA | | |