

Via W. Flemming, 7 - Z. I. 37026 Settimo di Pescantina (VERONA)

Tel. 045.6767672 - Fax 045.6757111

Sito internet: <http://www.farmec.it> - e-mail: farmec@farmec.it

Lotto n. 1

NEOXINAL 0,05%® SOLUZIONE CUTANEA clorexidina gluconato



Composizione

Principi Attivi: Clorexidina gluconato g 0,050.
Eccipienti: alcool etilico 96%, alcool isopropilico, colorante E122, acqua depurata.

Indicazioni Terapeutiche

Pulizia e disinfezione della cute lesa (ferite, ustioni...).

ATTENZIONE: prima dell'uso leggere tutte le informazioni contenute nel foglio illustrativo

La data di scadenza indicata, si riferisce al prodotto in confezione integra correttamente conservato.

Conservare a temperatura non superiore a 30°C, nella confezione originale per riparare il prodotto dalla luce.

TENERE LONTANO DALLA PORTATA E DALLA VISTA DEI BAMBINI

A.I.C. No. 032812099 busta da 25 ml

Titolate A.I.C. Nuova Farmec S.r.l. - Via W. Flemming, 7 - Settimo di Pescantina (VR)



Non disperdere nell'ambiente il contenitore vuoto dopo l'uso.
Rev. 00 del 10-07-07

farmec

NEOXINAL 0,05%® SOLUZIONE CUTANEA - clorexidina gluconato

FOGLIO ILLUSTRATIVO

Categoria terapeutica

Disinfettante per uso cutaneo.

Indicazioni Terapeutiche

Pulizia e disinfezione della cute lesa (ferite, ustioni...).

Controindicazioni

Ipersensibilità verso i componenti del prodotto.

Precauzioni per l'uso

Il prodotto è per esclusivo uso esterno.

L'uso, specie se prolungato, dei prodotti ad uso locale, può dare origine a fenomeni di ipersensibilizzazione, in tal caso interrompere il trattamento e consultare il medico per instaurare il trattamento sintomatologico adeguato.

Interazioni

Evitare l'uso contemporaneo d'altri antisettici e/o detergenti.

Avvertenze

Non usare per trattamenti prolungati; dopo breve periodo di trattamento senza risultati apprezzabili consultare il medico.

Non ingerire. L'ingestione può portare conseguenze gravi, talvolta fatali. Evitare il contatto con occhi ed orecchio medio.

Uso in gravidanza ed allattamento. Non risultano limitazioni d'uso durante la gravidanza o l'allattamento.

Dose, Modo e Tempo di Somministrazione

Tamponare la ferita con cotone abbondantemente imbevuto di NEOXINAL 0,05% SOLUZIONE CUTANEA. Ripetere, se necessario, l'operazione per un massimo di 3-4 volte al giorno. **NON SUPERARE LE DOSI CONSIGLIATE.**

Sovradosaggio

Non sono state riscontrate sindromi da sovradosaggio.

Effetti Indesiderati

È possibile il verificarsi di qualche caso di intolleranza (bruciore o irritazione) peraltro priva di conse-

guenze, che non richiede modifica del trattamento.

Il rispetto delle istruzioni riportate in questo foglio illustrativo riduce il rischio di effetti indesiderati.

È importante comunicare al medico o al farmacista la comparsa di qualunque effetto indesiderato anche non descritto in questo foglio illustrativo.

Scadenza e conservazione

Vedere la data di scadenza riportata sulla confezione.

La data di scadenza indicata si riferisce al prodotto in confezionamento integro correttamente conservato. Attenzione: non utilizzare il prodotto oltre la data di scadenza riportata sulla confezione.

Conservare a temperatura non superiore a 30°C, nella confezione originale per riparare il prodotto dalla luce.

I medicinali non devono essere gettati nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

Tenere il medicinale fuori dalla portata e dalla vista dei bambini.

Composizione

100 g di soluzione contengono:

Principio Attivo: Clorexidina gluconato g 0,050.

Eccipienti: alcool etilico 96%, alcool isopropilico, colorante E122, acqua depurata.

Forma Farmaceutica e Contenuto
Soluzione cutanea. Confezione da 400 bustine da 25 ml.

Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio e produttore

Nuova Farmec S.r.l. - Via W. Flemming, 7 Settimo di Pescantina (VR).

REVISIONE DEL FOGLIO ILLUSTRATIVO DA PARTE DELL'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO: gennaio 2012

farmec