

Via W. Flemming, 7 - Z. I. 37026 Settimo di Pescantina (VERONA)  
Tel. 045.6767672 - Fax 045.6757111  
Sito internet: <http://www.farmec.it> - e-mail: [farmec@farmec.it](mailto:farmec@farmec.it)

## Lotto n. 1



### NEOXINAL ALCOLICO 0,5%+70%® soluzione cutanea clorexidina gluconato + alcol etilico

#### Composizione

100 g di soluzione contengono:  
Principi attivi: Clorexidina gluconato g 0,50; alcool etilico 96% g 70,00.  
Eccipienti: acqua depurata.

**TENERE IL MEDICINALE FUORI DALLA PORTATA E DALLA VISTA DEI BAMBINI**

**ATTENZIONE:** leggere il foglio illustrativo prima dell'uso.

Usare con cautela nei neonati, soprattutto quelli nati prematuramente. Neoxinal può provocare ustioni chimiche.

#### Scadenza.

La data di scadenza indicata, si riferisce

al prodotto in confezione integra correttamente conservato.

Conservare a temperatura non superiore ai 30°C, nella confezione originale per proteggere il medicinale dalla luce. Prodotto facilmente infiammabile.

Non disperdere nell'ambiente il contenitore vuoto dopo l'uso.

#### FOGLIO ILLUSTRATIVO

**Categoria Terapeutica**  
Disinfettante per uso cutaneo.

**Indicazioni Terapeutiche**  
Pulizia e disinfezione della cute anche lesa (ferite, ustioni ...). È utilizzabile per la preparazione del campo operatorio e per l'antisepsi delle mani.

#### Controindicazioni

Ipersensibilità ai principi attivi o ad uno qualsiasi degli eccipienti.

#### Precauzioni per l'uso

Il prodotto è per esclusivo uso esterno. L'uso, specie se prolungato, dei prodotti ad uso topico, può dare origine a fenomeni di ipersensibilizzazione, in tal caso interrompere il trattamento e consultare il medico per istituire un'adeguata terapia. Usare con cautela nei neonati, soprattutto quelli nati prematuramente. Neoxinal può provocare ustioni chimiche.

#### Interazioni

Informare il medico o il farmacista se si è recentemente assunto qualsiasi altro medicinale, anche quelli senza prescrizione medica. Evitare l'uso contemporaneo di altri antisettici e/o detergenti.

#### Avvertenze

Non usare per trattamenti prolungati; dopo breve periodo di trattamento senza risultati apprezzabili consultare il medico.

Non esporre la parte trattata alla luce del sole dopo l'applicazione.

Non ingerire. L'ingestione o l'inalazione può portare conseguenze gravi, talvolta fatali. In caso di ingestione del prodotto istituire immediatamente idonea terapia.

Evitare il contatto con occhi, cervello, meningi e orecchio medio.

#### Uso in gravidanza ed allattamento

Non si ritiene che clorexidina gluconato possa causare effetti durante la gravidanza, dal momento che l'esposizione sistemica a clorexidina gluconato è trascurabile.

Neoxinal può essere usato in gravidanza.

#### Dose, Modo e Tempo di Somministrazione

Il prodotto va usato tal quale senza diluizioni. Applicare sull'area della cute direttamente interessata e su quella circostante mediante tamponi di cotone abbondantemente imbevuti, strofinando per almeno 30 secondi. Ripetere l'operazione per 2-3 volte al giorno. Nell'antisepsi delle mani: lavare ripetutamente le mani con 5-6 ml di prodotto per almeno un minuto. Non superare le dosi consigliate.

#### Sovradosaggio

Non sono state riscontrate sindromi da sovradosaggio.

In caso di ingestione/assunzione accidentale di una dose eccessiva di Neoxinal avvertire immediatamente il medico o rivolgetevi al più vicino ospedale.

#### Effetti Indesiderati

Come tutti i medicinali, Neoxinal può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

È possibile il verificarsi di qualche caso di intolleranza (bruciore o irritazione) che generalmente non richiede modifica del trattamento.

Frequenti applicazioni del prodotto possono provocare irritazione e secchezza della pelle.

Il rispetto delle istruzioni contenute nel foglio illustrativo riduce il rischio di effetti indesiderati. Se uno qualsiasi degli effetti indesiderati si aggrava, o se nota la com-

parsa di un qualsiasi effetto indesiderato non elencato in questo foglio illustrativo, informi il medico o il farmacista.

#### Scadenza e conservazione

Scadenza: Vedere la data di scadenza riportata sulla confezione.

La data di scadenza indicata si riferisce al prodotto in confezionamento integro correttamente conservato.

**Attenzione:** Non utilizzare il medicinale oltre la data di scadenza indicata sulla confezione.

Conservare a temperatura non superiore a 30°C, nella confezione originale per riparare il prodotto dalla luce.

Prodotto facilmente infiammabile.

I medicinali non devono essere gettati nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

**Tenere il medicinale fuori dalla portata e dalla vista dei bambini.**

#### Composizione

100 g di soluzione contengono:  
Principi attivi: Clorexidina gluconato g 0,50; alcool etilico 96% g 70,00.  
Eccipienti: acqua depurata.

**Forma Farmaceutica e Contenuto**  
Soluzione cutanea. 24 flaconi da 250 ml, 20 flaconi da 500 ml, 12 flaconi da 1 litro.

**Titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio e produttore**  
Nuova Farmec S.r.l. - Via W. Flemming, 7 - Settimo di Pescantina (VR)

REVISIONE DEL FOGLIO ILLUSTRATIVO DA PARTE DELL'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO: Gennaio 2015

Lotto n°

Titolare A.I.C. Nuova Farmec S.r.l. - Via W. Flemming, 7 - Settimo di Pescantina (VR)

A.I.C. No. 037894033

Revisione n.02 del 10-11-14

Scadenza

flacone da 500 ml USO CUTANEO

Data apertura flacone

farmec

nuova  
Farmec