

Via W. Flemming, 7 - Z. I. 37026 Settimo di Pescantina (VERONA)  
Tel. 045.6767672 - Fax 045.6757111  
Sito internet: <http://www.farmec.it> - e-mail: [farmec@farmec.it](mailto:farmec@farmec.it)

## Lotto n. 3 voce b



### FARVICETT 1,5%+15% CONCENTRATO® per soluzione cutanea clorexidina gluconato + cetrimide

#### Composizione

100 g di soluzione contengono:  
Principi Attivi: Clorexidina gluconato g 1,50;  
Cetrimide g 15,00  
Eccipienti: salicilato di metile, alcool isopropilico,  
essenza di limone, giallo tramonto (E110), acqua  
depurata.

TENERE IL MEDICINALE FUORI DALLA PORTATA E DALLA VISTA DEI BAMBINI.

ATTENZIONE: Leggere il foglio illustrativo prima dell'uso.

#### Scadenza:

La data di scadenza indicata si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.

Conservare a temperatura non superiore ai 30°C, nella confezione originale per proteggere il medicinale dalla luce.

Non disperdere nell'ambiente il contenitore vuoto dopo l'uso.

#### FOGLIO ILLUSTRATIVO

##### Categoria Farmacoterapeutica

Antisettici e disinfettanti - biguanidi e amidine.

##### Indicazioni Terapeutiche

Pulizia e disinfezione della cute lesa (ferite, ustioni...). Pulizia ed antisepsi esterna in ostetricia, ginecologia ed urologia. Disinfezione della cute integra.

##### Controindicazioni

Ipersensibilità ai principi attivi o ad uno qualsiasi degli eccipienti.  
Il prodotto non deve essere usato per la disinfezione delle cavità mucose (lavaggi, irrigazioni...).

##### Precauzioni per l'uso

Informare il medico o il farmacista se si è recentemente assunto qualsiasi altro medicinale, anche quelli senza prescrizione medica.

Il prodotto è solo per uso esterno.

L'uso, specie se prolungato, dei prodotti ad uso locale, può dare origine a fenomeni d'ipersensibilizzazione, in tal caso interrompere il trattamento e consultare il medico per instaurare il trattamento sintomatologico adeguato.  
Non applicare con bendaggio occlusivo.  
Evitare il contatto con occhi, orecchi, cervello e meningi.

Non esporre la parte trattata alla luce del sole dopo l'applicazione.

##### Interazioni

Evitare l'uso contemporaneo di altri antisettici e/o detergenti.

##### Avvertenze speciali

Non usare per trattamenti prolungati; dopo breve periodo di trattamento senza risultati apprezzabili consultare il medico.

Non ingerire. L'ingestione può portare conseguenze gravi, talvolta fatali. In caso di ingestione si consiglia di praticare la lavanda gastrica con latte, albume d'uovo, gelatina o sapone neutro.

##### Gravidanza e Allattamento

Chiedere consiglio al medico o al farmacista prima di prendere qualsiasi medicinale.

Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari

Farvicett non altera la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari.

##### Dose, Modo e Tempo di Somministrazione

Tampoonare la cute con cotone abbondantemente imbevuto di FARVICETT 1,5%+15% CONCENTRATO PER SOLUZIONE CUTANEA opportunamente diluito. Ripetere, se necessario, l'operazione per un massimo di 4-5 volte al giorno. NON SUPERARE LE DOSI CONSIGLIATE. Il prodotto deve essere usato solo diluito in acqua secondo il seguente schema:

Pulizia e antisepsi esterna in ginecologia, ostetricia ed urologia	una busta o 20 ml di soluzione in 2 litri d'acqua
Disinfezione della cute integra	una busta o 20 ml di soluzione in 500 ml d'acqua
Disinfezione e pulizia di ferite ed ustioni	una busta o 20 ml di soluzione in 1 litro d'acqua

##### Sovradosaggio

Non sono state riscontrate sindromi da sovradosaggio alle normali condizioni d'uso. I sintomi di intossicazione conseguenti all'ingestione accidentale di quantità rilevanti di composti ammonici quaternari comprendono nausea, vomito, dispnea, cianosi, asfissia conseguente alla paralisi dei muscoli respiratori, ipotensione e coma. La clorexidina è scarsamente assorbita nel tratto gastroenterale e dalla pelle.

In caso di ingestione/assunzione accidentale di Farvicett avvertire immediatamente il medico o rivolgetevi al più vicino ospedale.

Se si ha qualche dubbio sull'uso di Farvicett, rivolgersi al medico o al farmacista.

##### Effetti Indesiderati

Come tutti i medicinali, Farvicett può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

È possibile il verificarsi di qualche caso d'intolleranza (bruciore o irritazione) peraltro privo di conseguenze, che non richiede modifica del trattamento.

##### tamento.

Nei confronti della clorexidina è stato riportato qualche caso di idiosincrasia.

Il rispetto delle istruzioni riportate in questo foglio illustrativo riduce il rischio di effetti indesiderati. Se uno qualsiasi degli effetti indesiderati si aggrava, o se nota la comparsa di un qualsiasi effetto indesiderato non elencato in questo foglio illustrativo, informi il medico o il farmacista.

##### Scadenza e conservazione

Scadenza: vedere la data di scadenza riportata sulla confezione. La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato. Non utilizzare il medicinale dopo la data di scadenza riportata sulla confezione. Conservare a temperatura non superiore ai 30°C, nella confezione originale per proteggere il medicinale dalla luce.

I medicinali non devono essere gettati nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chiedere al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

TENERE IL MEDICINALE FUORI DALLA PORTATA E DALLA VISTA DEI BAMBINI.

#### Composizione

100 g di soluzione contengono:  
Principi Attivi: Clorexidina gluconato g 1 50  
Cetrimide g 15,00  
Eccipienti: salicilato di metile, alcool isopropilico, essenza di limone, giallo tramonto (E110), acqua depurata.

#### Forma Farmaceutica e Contenuto

Concentrato per soluzione cutanea. Confezioni da 12 flaconi da 1 litro e da 400 buste da 20 ml.

#### Titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio e Produttore

Nuova Farmec S.r.l. - Via W. Flemming, 7 - Settimo di Pescantina (VR).

REVISIONE DEL FOGLIO ILLUSTRATIVO DA PARTE DELL'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO: aprile 2012

Lotto n°

Titolare A.I.C. Nuova Farmec S.r.l. - Via W. Flemming, 7 - Settimo di Pescantina (VR)

A.I.C. No. 032644066

Revisione n. 01 del 02-05-12

Scadenza

flacone da 1000 ml

Data apertura flacone



nuova  
farmec  
S.r.l.