

CARATTERISTICHE FARMACI CITOTOSSICI INIETTABILE GRUPPO ATC L01

(ad eccezione dei preparati in siringa pronti per la somministrazione)

Lotto	Sub lotto	Descrizione principio attivo	Forma	Dosaggio
		VINDESINA SOLFATO	Pow. for Sol. for Inf.	5 mg

NOME FARMACO ELDISINE "5 mg Pow. for Sol. for Inj." 1 Amp.

DILUENTE DA UTILIZZARE PER LA RICOSTITUZIONE (PER LA FORMULAZIONE IN POLVERE)	10 ml NaCl 0.9% 10 ml H ₂ O per preparazioni iniettabili o soluzione fisiologica
CONCENTRAZIONE DELLA SOLUZIONE DOPO RICOSTITUZIONE (PER LA FORMULAZIONE IN POLVERE)	5 mg in 10 ml di diluente per la ricostituzione Non deve essere mai miscelato con altri farmaci
STABILITÀ DELLA SOLUZIONE RICOSTITUITA E TEMPERATURA DI CONSERVAZIONE	24 h + 2° C/+8° C se H ₂ O per preparazioni iniettabili oppure soluzione fisiologica
SOLUZIONE DA UTILIZZARE PER LA DILUIZIONE (OVE NECESSARIO)	
LIMITI DI CONCENTRAZIONE NEI SOLVENTI COMPATIBILI O VOLUME DI SOLVENTE DA UTILIZZARE PER LA DILUIZIONE	
STABILITÀ DELLA SOLUZIONE PRONTA PER LA SOMMINISTRAZIONE E TEMPERATURA DI CONSERVAZIONE SPECIFICANDO IL DILUENTE E IL CONTENITORE (VETRO/PP/PE/POF)	Stabile per 24 h a + 2° C/+8° C
INCOMPATIBILITÀ DELLA SOLUZIONE PRONTA PER LA SOMMINISTRAZIONE CON CONTENITORI	
COMPATIBILITÀ DEL FARMACO CON MATERIALI COSTITUENTI I DISPOSITIVI DI SOMMINISTRAZIONE E DI PREPARAZIONE	Può essere iniettata nel tubo di un' infusione endovenosa in corso (infusioni compatibili sono: soluzione fisiologica glucosata al 5%, soluzione fisiologica di NaCl, soluzione glucosata per uso endovenoso) oppure direttamente in vena

INCOMPATIBILITÀ DEL FARMACO CON MATERIALI COSTITUENTI I DISPOSITIVI DI SOMMINISTRAZIONE E DI PREPARAZIONE	
---	--

Il modulo deve essere compilato in tutte le sue parti; se non applicabile specificare "non applicabile".